# FICHE THEMA

### COMMENT DONNER UN MÉDICAMENT À VOTRE CHAT ?

Votre chat doit prendre les médicaments que son vétérinaire lui a prescrits. L'application du traitement est parfois compliquée et votre chat, comme de nombreux chats, cherche à échapper à vos soins. Voici quelques trucs et astuces pour vous faciliter la tâche.

#### Bon à savoir

Avant toutes choses, assurez-vous d'avoir à votre portée les médicaments, d'avoir bien lu les recommandations de votre vétérinaire et de vous situer dans un endroit calme et bien éclairé. Plus votre chat sera détendu, et plus il vous sera facile de lui administrer son traitement.

Ceci est d'autant plus important qu'il faudra certainement renouveler cet acte plusieurs jours... Si vous devez tenir votre chat plus « fermement », il est souvent plus facile de le poser sur vos genoux, dos contre vous, et de le maintenir par le poitrail. Si cela ne suffit pas, on peut enrouler le chat dans une serviette et ne laisser que la tête sortir.

A deux, une technique de contention simple et non douloureuse consiste à prendre à pleine main la peau derrière le cou et de la tenir fermement en agitant (une pince non traumatique, type pince à cheveux peut être utilisée si vous êtes seul!). Cette contention va calmer votre chat et va vous permettre de faire un certain nombre de soins simples.





La méthode la plus simple reste encore de pouvoir mélanger le liquide dans un peu d'aliment humide (pas de croquettes !) que votre chat apprécie.

Si cela n'est pas possible avec votre chat, il suffit de préparer par avance la quantité nécessaire dans une seringue et de pratiquer sensiblement de la même façon que pour les comprimés. Le chat assis sur vos genoux, maintenez-le fermement par la peau du cou en agitant très doucement et en relevant sa tête, votre chat aura tendance à ouvrir légèrement sa bouche. Introduisez la canule de la seringue à la commissure des lèvres, juste en arrière des canines et faites couler doucement le liquide. Si la quantité est importante, il est nécessaire de pratiquer par petites quantités et de bien attendre que votre chat déglutisse. Il faut particulièrement veiller à tenir la seringue de côté afin d'éviter d'envoyer le liquide dans le fond de la gorge par une pression excessive sur le piston de la seringue.

Certains chats peuvent avoir tendance à recracher une partie du liquide. Si c'est le cas du vôtre, n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire qui pourra alors si nécessaire en tenir compte et ajuster la dose.

Pensez à bien nettoyer au liquide vaisselle les instruments qui vous auront servi avant de les ranger !



## Comment faire avaler un comprimé?



Faire avaler un comprimé peut être un vrai défi si votre chat refuse de le prendre spontanément. En effet, même si la plupart des laboratoires ont travaillé sur des formes « appétentes », nos félins sont des généralement méfiants!

Vous pouvez « masquer » votre comprimé dans un aliment collant (beurre, morceau de thon...), qui va dissimuler l'odeur et le goût du médicament (attention, il faudra alors tenir compte des calories apportées si vous devez répéter régulièrement l'opération!). Il existe maintenant des supports spécialement créés par des laboratoires.

Il est dans ce cas important d'utiliser une petite quantité, pour vérifier que votre compagnon a réellement avalé le comprimé. Si votre chat persiste, et recrache son traitement, vous devrez administrer le comprimé directement dans la bouche de votre chat. Tout geste brusque ou toute nervosité seront stressants et vous risquez d'avoir des difficultés les fois suivantes! On pourra judicieusement « graisser » le comprimé au préalable avec du beurre pour en faciliter l'administration et masquer à la fois le goût et l'odeur : ceci le rendra plus facile à avaler.

Prenez alors le comprimé entre le pouce et l'index. Puis avec l'autre main, saisissez délicatement la tête de votre chat par

le dessus en plaçant votre pouce sur un côté de la mâchoire supérieure et vos doigts sur l'autre, en arrière de la commissure des lèvres. Inclinez la tête du chat légèrement en arrière, et avec la main tenant le comprimé, utilisez votre petit doigt ou l'annulaire pour ouvrir la bouche du chat en exerçant doucement une pression sur les dents inférieures et sur les commissures avec l'autre main. Placer

rapidement le comprimé aussi loin en arrière que possible, idéalement au-delà du bombé de la langue pour provoquer un réflexe de déglutition. Maintenez la bouche de votre chat fermée, ramenez la tête dans sa positon normale, et massez délicatement la gorge de votre compagnon pour favoriser la déglutition.

Habituellement, un chat qui a avalé un comprimé va se lécher les babines et le bout du nez. Si le type de traitement administré le permet, il est souhaitable de donner ensuite à manger à votre chat, afin de faciliter le parcours du comprimé jusqu'à l'estomac.

Si cette méthode ne convient pas, par exemple si votre chat est un peu turbulent, une variante consiste à soulever légèrement votre chat posé sur une table par la peau du cou, à la manière dont une chatte soulève ses chatons. Cette levée n'est pas douloureuse, a tendance à calmer le chat, et dans la plupart des cas votre chat va relâcher sa tension musculaire ce qui lui fait entrouvrir la bouche. Il est souvent plus facile de pratiquer à deux dans ce cas.

Enfin, afin de vous faciliter les choses, vous pouvez vous procurer un « lance pilule » auprès de votre vétérinaire. Ce petit dispositif simple ressemble à une seringue possédant à son extrémité une « pince » qui maintient le comprimé que le piston va libérer. Ceci permet de traiter des chats difficiles, mais aussi de s'assurer que le comprimé est posé assez loin en arrière de la langue (il est conseillé de s'entraîner à l'utilisation de cet appareil avant!)



### Conclusion:

Bien faire prendre ses médicaments à votre chat est absolument nécessaire à son traitement. La plupart des chats se laissent assez facilement faire en utilisant les gestes simples décrits ici. Cependant, si pour une raison quelconque il vous est impossible d'y parvenir, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire. Lui et son équipe sauront vous conseiller pour que le traitement suive son cours normalement.